 UNIVERSIDAD DE CHILE
 FACULTAD DE MEDICINA

FARMACOS IECAs, ARA II y DIURÉTICOS

MIGUEL A. MORALES S.
 PROFESOR ASOCIADO

FARMACOLOGÍA – MEDICINA 3º AÑO
 PROGRAMA DE FARMACOLOGÍA MOLECULAR Y CLÍNICA – ICBM

DOS CLASES PRINCIPALES DE INHIBIDORES DEL SISTEMA RAA, BLOQUEAN LAS ACCIONES DE ANGIOTENSINA II POR DIFERENTES MECANISMOS:

- LOS IECAs BLOQUEAN LA FORMACIÓN DE ANGIOTENSINA II INHIBIENDO SU CONVERSIÓN DESDE ANGIOTENSINA I.
- LOS IECAs TAMBIÉN BLOQUEAN LA INACTIVACIÓN DE BRADICININA.
- LA BRADICININA EJERCE IMPORTANTE ACCIÓN VASODILATADORA Y ANTIPROLIFERATIVA DE LA VASCULATURA.
- LOS ARA II BLOQUEAN DE MODO SELECTIVO EL RECEPTOR AT1 Y ASÍ EVITAN LOS EFECTOS DELETÉREOS DE ANGIOTENSINA II.
- LOS ARA II NO INFLUYEN EN EL METABOLISMO DE LA BRADICININA.

Receptores de Angiotensina

Receptor AT1

- Ubicación
 - Corazón, endotelio, músculo liso vascular, cerebro, riñón, suprarrenales
- Sistema de transducción de señales
 - Múltiples vías
- Media vasoconstricción, secreción de aldosterona y crecimiento celular

Receptor AT2

- Efecto antiproliferativo, proapoptótico y vasodilatador
- De expresión preferente en la vida fetal

IECAs y ARA II

Utilidad Clínica

- Hipertensión Arterial
- Insuficiencia Cardíaca Congestiva
- Infarto Agudo del Miocardio
- Daño Renal
- Nefropatía diabética
- Enfermedad Arteriosclerótica

IECAs y ARA II

Usos y Efectos Buscados

• EN LA HIPERTENSIÓN:

- **Disminución resistencia vascular periférica**
- **Aumento flujo sanguíneo renal**
 - Vasodilatación postglomerular
 - Aumento excreción de sodio
- **Mejoramiento función endotelial**
 - Bradicina y prostaciclina
 - Oxido nítrico
- **Sin cambios en gasto ni frecuencia cardíaca**
 - No hay activación simpática

IECAs Y ARA II

• EN LA INSUFICIENCIA CARDÍACA

Vasodilatación y ↓ de la postcarga

- ↓ Estrés de la pared ventricular
- ↑ Gasto cardíaco y de la fracción de eyección
- ↓ Frecuencia cardíaca
 - Atenuación simpática

Disminución de la precarga

- Venodilatación
 - ↓ retorno venoso
 - ↓ estrés diastólico
 - ↓ presión arterial pulmonar
- ↓ Resistencia renovascular
 - Aumenta flujo sanguíneo renal
- ↑ Natriuresis
- ↓ Volumen sanguíneo

* **Disminución significativa de la mortalidad**

RESULTADOS CLÍNICOS

EFFECTOS DE LOS IECAs EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA SINTOMÁTICA

Estado	CONSENSUS-I	SOLVD-T	V-HFT-II	SOLVD-P	SAVE	AIRE	TRACE
Pacientes	253	2.569	804	4.228	2.231	2.006	1.749
IM previo (%)	47	66	47	80	SI	SI	SI
Tratamiento							
Inicio (días)	> 60	> 30	> 90	> 30	3-16	3-10	3-7
Fármaco	Enalapril	Enalapril	Enalapril	Enalapril	Captopril	Ramipril	Trandolapril
Dosis (mg)	5-20	2,5-10	5-20	2,5-10	12,5-10	2,5-5	1-4
Dosis/día	2	2	2	2	3	2	1
Duración (meses)	1 d-20	22-25	6-68	14,6-62	24-60	6-30	24-?
Reducción de la mortalidad (%)	27	16	11,1	8	19	27	18
Pacientes tratados para salvar una vida	7	22	19		24	17	13

IM: infarto de miocardio; CONSENSUS-I: Cooperative New Scandinavian Enalapril Survival Study I; SOLVD-T: Studies of Left Ventricular Dysfunction, tema de tratamiento; V-HFT-II: Vasodilator-Heart Failure Trial II; SOLVD-P: Studies of Left Ventricular Dysfunction, tema de prevención; SAVE: Survival and Ventricular Enlargement; AIRE: Acute Infarction Ramipril Efficacy; TRACE: Trandolapril Cardiovascular Evaluation.

J. Florez, Farmacología Humana

IECAs y ARA II

• En el Infarto agudo del miocardio

- Disminución **morbimortalidad** y recurrencia
- En Infarto con disfunción ventricular
 - Disminución remodelamiento y prevención dilatación VI
- Mejoramiento función endotelial
- Efecto antiaterogénico coronario y sistémico

• En el Daño Renal

- Diabetes
- Proteinuria de otro origen

ADMINISTRACIÓN DE IECAs EN LAS PRIMERAS 24 HORAS TRAS UN INFARTO DE MIOCARDIO

Estado	SMILE	CONSENSUS-II	GISSI-3	ISIS-4	CCS
Pacientes	1.556	6.090	19.394	58.050	13.634
IM previo	Anterior	SI	SI	SI	SI
Tratamiento					
Inicio	6-24 horas	< 1 día	< 1 día	< 1 día	< 36 horas
Fármaco	Zofenopril	Enalapril IV	Lisinopril	Captopril	Captopril
Dosis (mg)	7,5-30	5-20	2,5-10	6,25-50	6,25-12,5
Dosis/día	2	2	1	2	3
Duración	12 meses	41-180 días	4 días	1 mes	28 días
Reducción de la mortalidad (%)	24	—	11	7,9	6,0
Pacientes tratados para salvar una vida	63	—	125	200	200

IM: infarto de miocardio; IC: insuficiencia cardíaca; SMILE: Survival of Myocardial Infarction Long-Term Evaluation; CONSENSUS-II: Cooperative New Scandinavian Enalapril Survival Study II; GISSI-3: Gruppo Italiano per lo studio della Sopravvivenza nell'Infarto Miocardico; ISIS-4: Fourth International Study of Infarct Survival; CCS: Chinese Captopril Study.

J. Florez, Farmacología Humana

IECAs Farmacocinética

	Metabolito	F	Comida	Tmax	T _{1/2}	Eliminación
Captopril	No	75	↓ F	<1Hr	2 Hrs	Renal
Enalapril	Si	60	No	3-4 Hrs	11 Hrs	Renal
Lisinopril	No	30	Poco	7 Hrs	12 Hrs	Renal
Ramipril	Si	50-60	Retarda	3 Hrs	15 Hrs	Renal

IECAs

Reacciones Adversas

- **Hipotensión**
 - Factores de riesgo
 - Hipovolemia
 - Diuréticos o múltiples antihipertensivos
 - ICC severa descompensada
 - Enfermedad renovascular oclusiva
- **Hiperkalemia* (determinar K+ plasmático)**
 - Factores de riesgo
 - Insuficiencia renal
 - Uso de Ahorradores de potasio
 - Uso de AINES
- **Aumento de la uremia** (inhibición del intercambiador cloro-úrico en el túbulo proximal)
- **Efectos atribuidos a bradicinina**
 - Tos, edema angioneurótico

IECAs

Reacciones Adversas

- **Teratogénesis**
 - Secundaria a hipotensión fetal
 - Anomalías óseas, falla renal, hipoplasia pulmonar, retardo del crecimiento
- **Efectos poco frecuentes**
 - Glucosuria
 - Hepatotoxicidad
- **Efectos de grupos -SH (captopril)**
 - Erupción cutánea
 - Proteinuria (dosis muy altas)
 - Neutropenia (< 1.000-1.500 neutrófilos/mm³)

IECAs

Contraindicaciones

- Estenosis renal bilateral o en riñón único
- Hipotensión
- Embarazo
- Antecedentes de angioedema

ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE ANGIOTENSINA (AT₁)

Losartán (1), Candesartán (2), Telmisartán (3), Valsartán (4)
 Losartán: 2-butil-4-cloro-1-[p-(o-1H-tetrazol-5-ilfenil)benzil]imidazol-5-metanol

USO TERAPÉUTICO: HIPERTENSIÓN

Bloqueadores de receptores de Angiotensina II (ARA II, ARBs)

LOSARTAN

- Bloqueo selectivo de receptores AT₁
- No produce tos
- No tiene efecto sobre bradicinina ni prostaglandinas
- Alternativa en pacientes intolerantes a IECAs
- Su eficacia no es superior a la de los IECAs
- Efecto máximo se alcanza en 3 a 6 semanas

CARACTERÍSTICAS FARMACOCINÉTICAS DE LOS ARA II

Fármaco	Tmax (horas)	Biodisponibilidad absoluta (%)	Vida media de eliminación (horas)	Unión a proteínas
Candesartán	3-4	15 %	9	>99%
Eprosartán	1.5-2	13%	5.7	98%
Ibosartán	1.5-2	80%-80%	11-15	90%
Losartán	1, 3-4 (*)	33%	2, 6-8 (*)	98.7%
Telmisartán	0.5-1	42%-58%	24	99.5%
Valsartán	2-4	25%	6	95%

Farmacocinética de Losartán:
Biodisponibilidad: 33%
Vida media: 2 h; metabolito activo: 9 h
Eliminación por vía hepática
No es profármaco

PERFIL DE EFECTOS ADVERSOS DE LOS DISTINTOS GRUPOS DE ANTIHIPERTENSIVOS					
Efecto Adverso	ARA II	IECA	Diuréticos	β -bloqueantes	Ca-antagonistas
Cefalea	-	-	-	-	+
Rubefacción	-	-	-	-	+a
Edema	-	-	-	-	+
Diseña	-	-	-	+	-
Bradicardia/Arritmia	-	-	-	+	+b
Fatiga	-	-	±	+	-
Frio en extremidades	-	-	-	+	-
Impotencia	-	-	+	+	-
Gota	-	-	+	-	-
Tos	-	+	-	-	-
Hipotensión Ortostática	-	-	+	-	-c

REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL Y DISMINUCIÓN DE LA TASA DE MORBIMORTALIDAD CARDIOVASCULAR

REDUCCIÓN DE 5-6 mm Hg EN LA PRESIÓN DIASTÓLICA Y DE 10-12 mm Hg EN LA PRESIÓN SISTÓLICA SE TRADUCE EN:

- REDUCCIONES DEL RIESGO DE 35-42% DE INFARTO
- REDUCCIÓN DE 12-16% DE ENFERMEDAD CORONARIA (TRAS 5 AÑOS DE TRATAMIENTO).

American Heart Journal 148: 747-754, 2004

LOS AGENTES ANTIHIPERTENSIVOS QUE ACTUAN EN EL SISTEMA RAA TIENEN UN MAYOR IMPACTO EN LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD CARDIOVASCULAR QUE OTROS ANTIHIPERTENSIVOS, ANTERIORMENTE DESARROLLADOS, QUE PRODUCEN REDUCCIONES SIMILARES EN LA PRESIÓN ARTERIAL

(American Heart Journal 148: 747-754, 2004.)

ESTUDIOS CLÍNICOS:

IECAS: CAPPF, STOP-2, HOPE, PROGRESS, ALLHAT, ANBP2, CONSENSUS I...

ARA II: LIFE, SCOPE, VALUE, ONTARGET, TRANSCEND...

NO HAY RESULTADOS CLÍNICOS QUE FUNDAMENTEN LA REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL O EL USO DE IECAs o ARA II PARA LA PREVENCIÓN DE LA RECURRENCIA DE INFARTO EN PACIENTES NORMOTENSOS

Hypertension 2010;55:819-831

GENERALIDADES ACERCA DE LOS DIURÉTICOS

INHIBIDORES DE LA ANHIDRASA CARBÓNICA

ACETAZOLAMIDA

Mecanismo de Acción:

Inhibición de la enzima evita la deshidratación de H_2CO_3 y la hidratación de CO_2

Efectos:

Disminuye la reabsorción de HCO_3^- en el riñón y así origina diuresis autolimitada. La acidosis metabólica hiperclorémica disminuye (acidifica) el pH corporal y aminora la presión intraocular.

Aplicaciones clínicas:

Glaucoma Alcalosis Metabólica
Mal de montaña
Edema con alcalosis

Presentaciones: oral y tópica. Duración de acción: 8 a 12 horas.

RAM y Efectos tóxicos: acidosis metabólica, Cálculos renales hiperamoniemia en cirróticos

DIURÉTICOS CON ACCIÓN EN EL ASA DE HENLE

FUROSEMIDA

Mecanismo de Acción:

Inhibición del transportador de $Na/K/2Cl$ en la porción ascendente del asa de Henle

Efectos:

Incremento notable de la excreción de $NaCl$, moderada pérdida de potasio, alcalosis metabólica hipopotasémica y mayor excreción de calcio y magnesio por la orina.

Aplicaciones clínicas:

Edema Pulmonar, Edema periférico, Hipertensión con hipervolemia, Hipercalcemia o Hiperpotasemia aguda, Insuficiencia renal aguda, sobredosis aniónica.

Presentaciones: Parenterales y orales. Duración de acción: 2 a 4 horas.

RAMs y Efectos tóxicos: Ototoxicidad, hipovolemia, pérdida de potasio, hiperuricemia e hipomagnesemia.

Diuréticos de asa: FUROSEMIDA

**Inhíbe la reabsorción de Na^+ , Cl^- , Ca^{++} y Mg^{++}
Aumenta la excreción de H^+ , K^+ , HCO_3^- y fosfato.**

Aplicaciones terapéuticas

Insuficiencia Cardíaca Cong. crónica
Hipertensión (no son de 1era línea)
Síndrome nefrótico
Edema agudo de pulmón

RAM y toxicidad

- Hiponatremia y depleción de volumen.
- Hipopotasemia, Hipomagnesemia e Hipocalcemia
- Alcalosis metabólica
- Hiperuricemia, Hiperlicemia

• LDL ↑ HDL ↓

DIURÉTICOS TIAZÍDICOS

HIDROCLOROTIAZIDA

Mecanismo de Acción:

Inhibición del transportador de Na/Cl en el túbulo contorneado distal

Efectos:

Incremento pequeño en la excreción de $NaCl$, pérdida de potasio moderada, alcalosis metabólica hipopotasémica, menor cantidad de calcio en la orina.

Aplicaciones clínicas:

Hipertensión, insuficiencia cardíaca leve, nefrolitiasis, diabetes insípida nefrótica.

Presentaciones: Preparados ingeribles. Duración de acción: 8 a 12 horas.

RAMs y Efectos tóxicos: Alcalosis metabólica hipopotasémica, hiperuricemia, hiperglicemia, hiponatremia.

Diuréticos tiazida: HIDROCLOROTIAZIDA

Acción a nivel del túbulo distal:

Aumento moderado de la excreción de $NaCl$, HCO_3^- , fosfato, K^+ , H^+ , magnesio y reabsorción de Ca^{++}

Aplicaciones terapéuticas

- Edema
 - ICC, cirrosis, síndrome nefrótico, Falla renal crónica
 - Infecciosos a filtración glomerular de $< 30-40 L/min$
- Hipertensión
- Osteoporosis
- Cálculos renales de calcio
- Diabetes insípida nefrótica

RAM y toxicidad

- Hipovolemia e Hipotensión
↓ K^+ , Na^+ , Cl^- , Mg^{++}
- Alcalosis metabólica
↑ Ca^{++} , ácido úrico
- Disminuye tolerancia a la glucosa
- Disminuye secreción de insulina
↑ LDL y HDL ↓
Triglicéridos

Porcentaje de Na^+ excretado por diuréticos

ANEXOS

DIURÉTICOS AHORRADORES DE POTASIO

ESPIRONOLACTONA

Mecanismo de Acción:

Antagonista de la aldosterona, antagonista débil de los receptores de andrógeno.

Efectos:

Disminuye la retención de sodio y la pérdida de potasio por los riñones. Antagonismo de la aldosterona en corazón y vasos, poco comprendida.

Aplicaciones clínicas:

Aldosteronismo de cualquier causa; hipotasemia por otros diuréticos, estado ulterior al infarto de miocardio.

Presentaciones:

Parenterales y orales. Duración de acción: 24 a 48 horas. Inicio lento del efecto.

RAMs y Efectos tóxicos: Hiperpotasemia, ginecomastia (con la espironolactona). Interacciones aditivas con otros fármacos que retienen potasio.

DIURÉTICOS AHORRADORES DE POTASIO

AMILORIDA

Mecanismo de Acción:

Antagonista de los canales de Ca⁺⁺ en el epitelio de los túbulos colectores.

Efectos:

Disminuye la retención de sodio y la pérdida de potasio por los riñones. Incrementa la eliminación de Litio.

Aplicaciones clínicas:

Hipotasemia por otros diuréticos. Disminuye la poliuria inducida por Litio.

Presentaciones: Oral. Duración de acción: 24 horas.

RAMs y Efectos tóxicos: Acidosis metabólica hiperpotasémica

DIURÉTICOS OSMÓTICOS

MANITOL

Mecanismo de Acción:

Efecto osmótico físico en la distribución de agua hística, porque es retenido en el compartimento vascular.

Efectos:

Incremento notable en la producción de orina; disminución del volumen encefálico; menor presión intraocular; hiponatremia inicial seguida por hipernatremia.

Aplicaciones clínicas:

Insuficiencia renal por una mayor carga de solutos (Rabdomiolisis, quimioterápicos); incremento de la presión intracraneal; glaucoma.

Presentaciones: Administración I.V.

RAMs y Efectos tóxicos: Náuseas, vómitos, cefalea.

DIURÉTICO ANTAGONISTA DE VASOPRESINA

CONIVAPTÁN

Mecanismo de Acción:

Antagonista al nivel de receptores de Vasopresina, ADH, V_{1a} y V₂

Efectos:

Disminuye la reabsorción de agua e incrementa la concentración de sodio plasmático.

Aplicaciones clínicas:

Hiponatremia. Falla cardíaca.

Presentaciones: Administración I.V. solamente.

RAMs y Efectos tóxicos: Reacciones en el sitio de venoclisis; Diabetes insípida nefrogénica. (No autorizado por la FDA).

IECAS (Farmacocinética)

Característica	CAPTAPRIL	ENALAPRIL	FOSINOPRIL
Grupo funcional	-SH	-COOH	-PO ₂
Biodisponibilidad	75%	60%	36%
Vida Media	2h	11h	11,5h
Durac. de acción	3-4 h	12-24 h	12-24 h
Eliminación	renal	renal	Renal/hepat.
Profármaco	No	Si	Si

Grados de hipertensión arterial según valores de presión arterial en mayores de 18 años

	Sistólica (mm Hg)	Diastólica (mm Hg)
Normal elevada	130-139	85-89
Hipertensión		
Estadio 1 (leve)	140-159	90-99
Estadio 2 (moderada)	160-179	100-109
Estadio 3 (grave)	180-209	110-119
Estadio 4 (muy grave)	≥ 210	≥ 120

J. Flórez, Farmacología Humana

Óptimo: 120/80 mmHg

METAS DEL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO

- Reducción de las cifras de presión arterial, a lo mas normal que sea alcanzable.
- Disminución de la morbimortalidad,
- Modificar los factores de riesgo cardiovascular
- Prevenir la enfermedad.

Sistema Renina - Angiotensina - Aldosterona

Manejo de efectos adversos de IECA y ARA II

- ¿Qué hacer si aparece...
- ...hipotensión sintomática?
 - Reconsiderar la necesidad de nitratos, antagonistas del calcio y otros vasodilatadores.
 - Reducir dosis de diuréticos si no hay signos/síntomas de congestión.
 - ...empeoramiento de la función renal?
 - Si el incremento de urea, creatinina y potasio es pequeño: no hacer NADA.
 - Son aceptables ligeros incrementos de creatinina y de potasio (hasta 5,5 mEq/L).
 - Suspender medicamentos: nefrotóxicos (ej: AINE), diuréticos ahorradores de K+ y disminuir dosis de diuréticos.
 - Disminuir dosis de IECA o suspender tratamiento.
 - ...tos (por IECA)?
 - Descartar que la tos sea debida a la propia IC o a otras patologías.
 - Cuando sea muy molesta y se haya probado que es debido al IECA: sustituir por ARA II.

Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Management of chronic heart failure. Edinburgh: SIGN;2007. (SIGN Guideline nº 95).

Sistema Renina Angiotensina Aldosterona
Tisular o sistémico