FÁRMACOS ANTICOLINÉRGICOS O ANTAGONISTAS MUSCARÍNICOS

María E. Quintanilla Medicina 2011
Prof. Programa Farmacología
Molecular y Clínica

Inhiben las acciones muscarínicas de la acetilcolina

Inhiben la Función del parasimpático

Clasificación de los anticolinérgicos

1.- Alcaloides Naturales

Atropina

Atropa Belladonna

Escopolamina

Hyoscyamus Nigers

2.- Anticolinérgicos Sintéticos

Atropina (Fármaco tipo)

Farmacocinética

- Buena absorción todas las vías.
- Cruza al SNC
- $t_{1/2}$ 2.5 – 4 hrs
- 50% unión pp
- Eliminación por biotransformación y excreción

Clotho, Atropos, and Lachesis. (Roman relief, in Schloss Tegel, near Berlin.)

Atropina

¿ Cual es su mecanismo de acción?

Atropina bloquea receptores muscarínicos Mecanismo: antagonismo competitivo superable

Características farmacodinámicas de atropina

1. Tiene mayor afinidad que acetilcolina por r. muscarínicos

2. No tiene actividad intrínseca. α igual cero

Atropina bloquea solo los receptores muscarínicos, no los nicotínicos.

Atropina bloquea todos los subtipos de receptores muscarínicos

Atropina

¿ Cuales son sus acciones farmacológicas?

1. SNC

A dosis terapéutica

Atropina → Muy leve estimulación

Escopolamina → Sedación (somnolencia amnesia)

Uso clínico escopolamina: Cinetosis

Dosis tóxicas (intoxicación atropínica)
Excitación, depresión, coma

2. OJO

1.- Midriasis (relajan músculo circular) → Fotofobia

Uso clínico: examen fondo ojos

2.- ↑ Presión ocular pacientes con glaucoma o predisposición

Contraindicados en el glaucoma

3.- Cicloplejia (parálisis acomodación)

3.-Sistema Cardiovascular

1. Corazón

Taquicardia

Uso clínico: premedicación anestésica

2. Vasos sanguíneos

A dosis terapéutica acción escasa

Dosis tóxicas (intoxicación atropínica)
Arritmia
Rubor atropínico

4.- Sistema urinario

↓ tono y la contracción músculo detrusor de la vejiga

↓ tono y la motilidad de los ureteres

Contraindicados en cuadros de retención urinaria
Ejm: hipertrofia prostática

Uso clínico: alivio del dolor cólico renal (F. 2ª línea)

Dosis tóxicas (intoxicación atropínica)
Globo vesical

5. Glándulas sudoríparas

Inhibe la sudoración

Dosis tóxicas (intoxicación atropínica en niños)
Fiebre atropínica (42°C)

6.- Aparato digestivo

1.- ↓ tono y peristaltismo gastrointestinal

Uso clínico: antiespasmódico en cólico intestinal

2.- ↓ tono vesícula biliar

Uso clínico: antiespasmódico en cólico biliar

3.- ↓ secreción gástrica ácida

Uso clínico: Anticolinérgicos fueron los primeros usados en úlcera péptica. Hoy no se usan por RAM

↓ Secreción salival, sudoración
midriasis
taquicardia
constipación
↓ Secreción gástrica

6.- Aparato digestivo

4.- Xerostomia

Dosis tóxicas (intoxicación atropínica)
Constipación

7. Bronquio

Broncodilatación. Útiles para asma y bronquitis

Inconvenientes del uso de anticolinérgicos como broncodilatadores:

- 1.- Inhiben movimiento ciliar del epitelio bronquial
- 2.- Producen boca seca, constipación, taquicardia (por su acción anticolinérgica en otros órganos)

Uso clínico: Hay anticolínticos usados en asma y bronquitis

Inhiben secreción nasal faríngea y bronquial

Uso clínico anticolinérgicos: premedicación anestésica para impedir laringoespasma

Usos clínicos de Atropina

- 1.- Antiespasmódico
- 2.- Exámenes oftalmológicos
- 3.- Premedicación anestésica
 - evita bradicardia refleja
 - evita ↑ secreciones
- 4.- Intoxicación con organofosforados u hongos que contienen muscarina.

Anticolinérgicos sintéticos de uso específico en oftalmología

F-F Colirios **Midriasis y cicloplejia más corta que atropina**

Ciclopentolato → 1 día

Tropicamida → 6 horas

Uso clínico: exámenes oftalmológicos

Anticolinérgicos sintéticos de uso específico por vía inhalatoria como broncodilatadores

F-F
Aerosol y solución para nebulización

Ventajas

Bromuro Ipratropio

- Acción selectiva bronquio (no se absorbe, posee carga)
- Mínimos efectos secundarios. Casi no llega a otros órganos
- No inhibe limpieza mucociliar

Uso clínico: asma, bronquitis

Anticolinérgicos sintéticos de uso específico como antiespasmódico

Mayor selectividad Musc liso G.I. y urinario

Compuestos amonio cuaternario (con carga)

Bromuro de Clidinio (Libraxin®)

Bromuro de Hioscina (Baralgina®)

Aminas terciarias (sin carga)

Propinoxato (Viadil®)

Debido a su absorción oral reducida, por lo que concentran su acción a nivel enteral

Porque acción espasmolítica se debe a: (i) acción anticolinérgica y (ii) acción relajante directa musc liso

Anticolinérgicos sintéticos de uso específico en úlcera péptica

Pirenzepina

Antagonista selectivo receptores M₁

Inhibe secreción gástrica actuando en receptores M₁ ganglio intramural estómago y glándulas secretoras gástricas