

Modulo integrador

Caso 1

Paciente de sexo femenino, de 67 años de edad, que paciente notó una lenta disminución de la visión a distancia y de cerca, más aún en el ojo derecho que el izquierdo. Ella estaba teniendo dificultad creciente con el resplandor de las luces brillantes en la noche, al ver las señales de tráfico, ver televisión y leer el periódico.

Historial Oftalmológico:

- Hace cuatro años había consultado con usted, presentando lo siguiente:
Rp:
OD: $-1.0 = -0.5 \times 180 - 0,5$
OI: $-1.0 = -0.75 \times 180 - 0,6$
por lo que usted la derivó. El médico oftalmólogo indicó control en 1 año, sin embargo el paciente no volvió a consultar hasta la fecha.
- No hay antecedentes de cirugía ocular o trauma.

Historial médico:

- HTA + , en tratamiento con aspirina, furosemida y atenolol
- DM + tipo 2, con 14 años de evolución, insulínica hace 2 años.
- Accidente cerebrovascular hace 8 años.
- Alcohol –
- Tabaquismo –

Historial Familiar:

- DM tipo 2 padre y madre
- Catarata padre y madre

AV:

VOD sc: CD a 3 mt

VOI sc: 0,05

Rp:

OD: $-4,0 = -1 \times 180 - 0,05$

OI: $-3,0 = -1 \times 160 - 0,15$

- Motilidad Ocular sin alteraciones.
- RFM +,+. DPAR –
- PIO neumática, 21 mmHg, 20mmHg

Lámpara de Hendidura:

OD:

- Párpados: telangiectasias en el margen, dermatochalasis
- Conjuntiva: Sin inyección
- Córnea: Clara
- Cámara anterior: normal
- Iris: normal, sin neovascularización
- Cristalino: NO6 C3

OI:

- Párpados: Telangiectasias en el margen, dermatochalasis
- Conjuntiva: Sin inyección
- Córnea: Claro
- Cámara anterior: Normal
- Iris: normal, sin neovascularización
- Cristalino: NC4 C2

Fondo de Ojo y rojo pupilar:

OD: No se puede evaluar debido a la catarata

OI: Rojo pupilar presente pero disminuido.

Instrucciones:

Especifique claramente la hipótesis diagnóstica de este caso. Además, reseñe brevemente la epidemiología, signos síntomas, fisiopatología y posible tratamiento de la patología.

Especifique cuáles son los criterios de derivación en general, y especifique todos y cada uno de los criterios de derivación de la norma técnica N°126 que detecte.

Detalle cuál es el protocolo de derivación a nivel secundario o terciario que realizaría en este caso en particular, refiriéndose a la referencia, e incluyendo la contrarreferencia luego de la resolución de esta patología

Diseñe un protocolo de atención para este paciente.