## Quiz: "Peritoneo y Supramesocólico"

- 1. Cual de estos son recesos o espacios de la cavidad peritoneal:
  - Receso subhepatico
  - II. Receso subfrénico
  - III. Espacio retropúbico
  - IV. Fosa ovárica
  - a. Iyll
  - b. I, III y IV
  - c. I, II y IV
  - d. I y IV
- 2. Seleccione la alternativa incorrecta:
  - a. El omento menor se relaciona con la curvatura menor del estómago.
  - b. La 2da porción del duodeno está peritonizada y va desde L2 a L3.
  - c. El mesenterio va descendiendo de izquierda a derecha.
  - d. El apéndice tiene un meso.
- 3. Respecto a los ligamentos relacionados a los omentos, seleccione la relación correcta:
  - a. Omento mayor 

    Ligamento hepatoduodenal
  - b. Omento menor [Ligamento coronario
  - c. Omento mayor 🛮 Ligamento gastroesplénico
  - d. Omento menor 🛮 Ligamento gastrocólico
- 4. ¿Cuál de estas arterias NO proviene del tronco celíaco o de la arteria gastroduodenal?
  - a. Arteria hepática común.
  - b. Arteria pancreaticoduodenal superior anterior.
  - c. Arteria pancreaticoduodenal superior posterior.
  - d. Arteria pancreaticoduodenal inferior.
- **5.** Respecto al estómago, seleccione la alternativa correcta:
  - a. Tiene 3 tipos de fibras musculares, siendo las fibras circulares las más externas y las oblicuas las más internas.
  - b. El cardias tiene relación con el duodeno.
  - c. Su curvatura menor tiene relación con la incisura angular.
  - d. La escotadura cardial está más medial que el esófago abdominal.
- **6.** En cuanto a los pliegues umbilicales, cuál es falsa:
  - a. El ligamento umbilical medio tiene relación con el alantoides.
  - b. Los pliegues umbilicales mediales tienen relación con el uraco obliterado y venas paraumbilicales.
  - c. Los pliegues umbilicales laterales contienen los vasos epigástricos inferiores.
  - d. Los pliegues umbilicales mediales tienen relación con la arteria umbilical obliterada.

## Programa de Ayudantes Docentes – Anatomía I MED

- **7.** Respecto al hígado, es correcto mencionar:
  - a. El lobo caudado tiene relación con la vena cava inferior.
  - b. El lobo izquierdo tiene por su cara visceral impresiones gástricas y esofágicas.
  - c. El lobo cuadrado tiene relación con el ligamento triangular.
  - d. Por una visión anterior, se puede visualizar en el lobo derecho una impresión cólica.
- **8.** Respecto a la bolsa omental:
  - I. Su pared inferior está compuesta por la 2da porción del duodeno.
  - II. Su receso superior se relaciona con el esófago y el cuerpo del estómago.
  - III. Su pared superior es el lobo caudado del hígado y posterior el peritoneo parietal revistiendo a la vena cava inferior.
  - IV. Anteriormente, tiene relación con el ligamento hepatoduodenal.
  - a. I y III
  - b. II y IV
  - c. I, III y IV
  - d. II, III y IV

## **Respuestas:**

- **1.** C
- **2.** B
- **3.** C
- **4.** D
- **5.** C
- **6.** B
- **7.** A
- **8.** D