

Taller Farmacología Geriátrica

QF Daniel Palma V. PhD

Profesor Asistente

Universidad de Chile

Recursos

- Fórmula Cockcroft-Gault



- Escala anticolinérgica (ACB)



Recursos

- Criterios de Beers



Formulario de respuesta



- Tomo conocimiento del caso: GRE, mujer, 96 años, Previsión: FONASA
-
- Antecedentes biomédicos: ICFEp (2016), HTA, depresión por duelo patológico (2017)
- Medicamentos utilizados antes de la hospitalización (9):
 - Alprazolam 0,125 mg cada 24 horas vo
 - Losartan 50 mg cada 12 horas vo
 - Furosemida 20 mg cada 48 horas vo
 - Carvedilol 3,125 mg cada 12 horas vo
 - Hidralazina
 - Espironolactona 12,5 mg cada 12 horas vo
 - Zopiclona 7,5 mg cada 24 horas vo
 - Sertralina 50 mg cada 24 horas vo
 - Melatonina 3 mg cada 24 horas vo
- Alergias (-) Hábitos: TBQ (-); OH (-); Drogas (-)
-
- Motivo de ingreso: Suboclusión intestinal (resolución médica).
- Síndromes geriátricos: Polifarmacia, trastorno del sueño, trastorno del ánimo.
- Problemas de salud actuales: hiponatremia con VEC contraído, uso crónico de benzodiazepina, uso crónico de ISRS en paciente con hiponatremia obs. Crónica.

VFG

- Variables:
- Cr: 0,5 mg/dL
- BUN: 7 mg/dL
- ALB: 2,5 g/dL
- Peso: 75 kg