UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
UTE SIMULACIONES PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL

Pauta de evaluación práctica

Preparación biológica y Restauración con resina compuesta en dientes posteriores

Tarea a ejecutar: Restauración con resina compuesta de la preparación biológica OM del **diente 1.6**, en **120 minutos**

Etapas del procedimiento que serán evaluadas:	Porcentaje
Bioseguridad	2%
Pre acuñado	3%
Preparación biológica	35%
Aislamiento Absoluto	10%
Sistema matriz	5%
Restauración	45%
Total	100%

Criterios reprobatorios

Realizar la preparación biológica en un diente que no corresponde al señalado y/o en una superficie distinta a la indicada
No cumplir la tarea en el tiempo asignado
Dañar el diente vecino: verificar **previamente** que el diente vecino esté indemne
Desgastar la estructura dentaria al pulir
Restauración sin punto de contacto proximal (**verificación visual**): verificar previamente que los dientes presenten punto de contacto.
Preparación biológica que debilite cúspides y/o rodete marginal distal.
Preparación biológica con compromiso pulpar (pared axial y/o pulpar).

En caso de presentar alguno de los criterios descritos como reprobatorios u obtener una **nota menor a 4.0**, el estudiante debe realizar la evaluación práctica nuevamente, hasta lograr completar la tarea asignada de manera correcta, siendo descontados 0,5 puntos por cada nuevo intento.

Escala de apreciación	Descripción	Puntaje
Logrado Satisfactoriamente	Cumple completamente con lo establecido en el criterio	3
Logrado con reparos	Cumple parcialmente con lo establecido en el criterio (fallas menores posibles de corregir con facilidad para lograr completamente el criterio o hasta 2 errores)	2
Por lograr	Cumple parcialmente con lo establecido en el criterio (fallas mayores difícil de corregir para lograr completamente el criterio o más de 2 errores)	1
No logrado	No cumple con lo establecido en el criterio y/o se encuentra establecido como NOTA (*)	0

	Nombre del estudiante											
Bioseguridad												
Uso de EPP:	Utiliza correctamente durante todo el procedimiento los EPP: gorro, mascarilla, guantes y protección ocular. **NOTA: No usa mascarilla, gorro, protección ocular y/o guantes***											
Áreas de trabajo e instrumental	Dispone de todo el instrumental requerido, lo organiza y diferencia claramente en las áreas de trabajo, manteniendo orden y limpieza durante todo el procedimiento y respeta el flujo entre las áreas de trabajo durante todo el procedimiento.											
Posición de trabajo	Mantiene postura ergonómica durante todo el procedimiento: espalda recta, pies apoyados en el suelo, brazos al costado del cuerpo, la cabeza no debe estar en posición adelantada respecto del cuello. **NOTA: Se le advierte en más de 3 oportunidades que no cumple con el criterio***											
Visión indirecta	Realiza todo el procedimiento con visión indirecta. **NOTA: Se le advierte en más de 3 oportunidades que no cumple con el criterio*.**											
	Puntaje											
	2%											

Nombre del estudiante												
Pre acuñado												
Cuña	Utiliza cuña en posición correcta: Hacia el diente a tratar, desde la tronera más angosta, base de la cuña hacia cervical, queda ajustada y ejerce presión. **NOTA**: **no utiliza cuña***											
Banda	Utiliza banda en posición correcta: Hacia el diente vecino, cubre toda la superficie proximal del diente vecino. **NOTA: no utiliza banda***											
	Puntaje											
	3%											

Preparación biológica												
Cajón oclusal	Preparación conservadora, ángulos internos redondeados, paredes de contorno lisas y paralelas al eje longitudinal del diente. Pared pulpar lisa y paralela al plano oclusal, profundidad suficiente para el material restaurador.											
Cajón proximal	Preparación conservadora, paredes de contorno vestibular y palatina divergentes hacia proximal y paralelas al eje longitudinal del diente. Pared cervical debe ser plana, lisa, paralela al plano oclusal y ubicada hacia cervical del punto de contacto proximal. La pared axial es ligeramente convexa siguiendo la anatomía externa del diente con una profundidad de 1,5 – 2 mm.											
Punto de contacto proximal	Libera punto de contacto hacia cervical, vestibular y palatino. **NOTA: No libera punto de contacto ***											
	Puntaje											
	35%											

	Nombre del estudiante											
Aislamiento												
Clamp	Utiliza el clamp adecuado: Ligado, estable, en orientación correcta (arco tensor hacia distal), ubicado en el extremo distal de la goma dique.											
Arco de Young	El arco de Young y la goma dique centrados a la cavidad bucal, el arco está en su orientación correcta y sobre la goma dique.											
Resultado del aislamiento	Aislamiento absoluto con campo operatorio seco: Goma dique bajo las alas del clamp, perforaciones acordes al tamaño de los dientes, fijación en ambos extremos del aislamiento. **NOTA: Aislamiento con filtraciones *.**											
Retiro del aislamiento	Retira el aislamiento: Corta la ligadura, retira la fijación anterior del aislamiento, corta la goma dique en los espacios interdentarios, retira el clamp.											
	Puntaje											
	10%											

	Nombre del estudiante											
Acuñado												
Banda	Si utiliza sistema de anillo, la banda debe ser pre contorneada. En el caso de porta matriz Tofflemire el tamaño del ojal debe ser adecuado para que la banda quede adaptada al diente. La banda debe estar adosada en cervical de la preparación biológica sin dejar pasar luz ni atrapar la goma dique. Debe sobrepasar en aproximadamente 1 mm la zona del futuro rodete marginal y estar adosada al diente vecino. **NOTA: No utiliza banda ***											
Cuña	Utiliza cuña en posición correcta: hacia el diente vecino (adosando la banda al diente a restaurar), desde la tronera más amplia, con la base de la cuña hacia cervical, ajustada y ejerciendo presión. **NOTA: No utiliza cuña***											
Porta matriz	En posición correcta: - Anillo en el espacio interproximal sosteniendo la banda, el anillo no estorba para ejecución de la restauración. - Tofflemire se encuentra paralelo al corredor vestibular y la ranura se encuentra hacia cervical.											
	Puntaje											
	5%											

Restauración												
Oclusión	Presenta al menos 3 puntos de oclusión, ninguno en la interfase diente – restauración, oclusión estable. **NOTA: presenta excesos que la alteran*.**											
Anatomía dentaria	La restauración devuelve la morfología del diente: Contorno proximal (sin hombro), rodete marginal, surcos, fosas, proceso											

	adamantino, facetas armadas, aristas armadas, etc. **NOTA: Sobrepasa los límites de la preparación biológica y/o presenta hombro*.**											
Adaptación Marginal	La sonda presenta paso suave entre el diente y la restauración, sin saltos (leve exceso en el margen que se puede pulir) ni desajustes **NOTA: Presencia de brecha*.**											
Contacto proximal	En correcta ubicación, opone resistencia adecuada al paso de la seda dental (intensidad). **No presenta punto de contacto a la inspección visual (REPROBATORIO).**											
Aspecto superficial	La superficie de la restauración no presenta defectos, el resultado es similar al esmalte: sin vetas ni poros, con lisura superficial y brillo.											
	Puntaje											
	45%											

Tabla Resumen:								
Estudiante	Bioseguridad	Pre acuñado	PB	Aislamiento	Acuñado	Restauración	Descuento por intentos	NOTA

Bioseguridad

Puntaje	Nota	Puntaje	Nota
0.0	1.0	10.0	5.8
1.0	1.4	11.0	6.4
2.0	1.8	12.0	7.0
3.0	2.3		
4.0	2.7		
5.0	3.1		
6.0	3.5		
7.0	3.9		
8.0	4.5		
9.0	5.1		

Pre acuñado

Puntaje	Nota
0.0	1.0
1.0	1.8
2.0	2.7
3.0	3.5
4.0	4.5
5.0	5.8
6.0	7.0

Preparación biológica

Puntaje	Nota
0.0	1.0
1.0	1.6
2.0	2.1
3.0	2.7
4.0	3.2
5.0	3.8
6.0	4.5
7.0	5.3
8.0	6.2
9.0	7.0

Aislamiento

Puntaje	Nota	Puntaje	Nota
0.0	1.0	10.0	5.8
1.0	1.4	11.0	6.4
2.0	1.8	12.0	7.0
3.0	2.3		
4.0	2.7		
5.0	3.1		
6.0	3.5		
7.0	3.9		
8.0	4.5		
9.0	5.1		

Acuñado

Puntaje	Nota
0.0	1.0
1.0	1.6
2.0	2.1
3.0	2.7
4.0	3.2
5.0	3.8
6.0	4.5
7.0	5.3
8.0	6.2
9.0	7.0

Restauración

Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota
0.0	1.0	5.0	2.7	10.0	4.5	15.0	7.0
0.5	1.2	5.5	2.8	10.5	4.8		
1.0	1.3	6.0	3.0	11.0	5.0		
1.5	1.5	6.5	3.2	11.5	5.3		
2.0	1.7	7.0	3.3	12.0	5.5		
2.5	1.8	7.5	3.5	12.5	5.8		
3.0	2.0	8.0	3.7	13.0	6.0		
3.5	2.2	8.5	3.8	13.5	6.3		
4.0	2.3	9.0	4.0	14.0	6.5		
4.5	2.5	9.5	4.3	14.5	6.8		