

Control de lectura

Crédito Tratamiento Ortodóncico Multidisciplinario
Santiago Segundo Control Dr. Dreyer

Nombre: _____

Responda brevemente las siguientes preguntas:

1.- ¿Cuál fue el criterio de clasificación para distribuir la muestra? ¿Cuántos grupos hicieron? Descríbalo brevemente.

Se clasificaron de acuerdo al número de paredes dentarias remanentes. 6 grupos. Además se formaron subgrupos: sin retención, con poste prefabricado y poste de fibra personalizado.

- 1) Todas las paredes coroneales presentes.
- 2) Tres paredes presentes.
- 3) Dos paredes presentes.
- 4) Una pared intacta.
- 5) Sin paredes, un collar de dentina $> 2\text{mm}$.
- 6) Sin paredes, un collar de dentina $< 2\text{mm}$.

2.- ¿Cuál fue el grupo que falló menos? ¿Cuál es la explicación que da el autor?

El grupo con menos fallas fue el que tenía mas paredes dentarias y poste prefabricado. El elemento predictor de éxito más grande es la preservación del remanente dentario y las propiedades mecánicas más fuertes de postes prefabricados que de fibra.

3.- En su opinión y después de leer el artículo...¿Cuál podría ser su conducta al evaluar la predictibilidad de un diente con endodoncia y corona?

Que no todos los dientes tratados con endodoncia y coronas son frágiles o están destinados a fallar per se. Se debe evaluar cuánto remanente dentario queda y qué tipo de poste se usó. Se podría interactuar con el Rehabilitador Oral y discutir sobre este tema.