



SARNA CHORIOPTICA Y OTODECTICA

Galia Ramírez Toloza
M.V., Ph.D.
Depto. Medicina Preventiva
Unidad de Parasitología
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
Universidad de Chile

SARNA CHORIOPTICA



SARNA CHORIOPTICA

- Producida por el género *Chorioptes spp*
- Existen diferentes variedades que viven en la piel de diferentes animales domésticos causando **sarna coriódptica**
- *Chorioptes bovis*
- *Ch. var equi*
- *Ch. var ovis*
- *Ch. var caprae*
- *Ch. var cuniculi*



DIAGNOSTICO

- Raspado de piel
- Diferenciar de *Psoroptes*



Psoroptes *Chorioptes*

MANIFESTACIONES CLINICAS

- Equino → Prurito, irritación, pápulas y costras. Afecta las patas (bajo el tarso y carpo)
- Rumiantes → afecta principalmente la base de la cola y región sacra y otras partes del cuerpo (más prevalente en invierno)
- Ovejas → piernas y escroto (Dx diferencial de *P. ovis*)
- Conejo → conducto auditivo externo

SARNA OTODECTICA

- Producida por *Otodectes cynotis*
- *O. var cati*
- *O. var canis*
- Afecta las orejas de perros, gatos, zorros, hurones y otros carnívoros
- Ciclo de vida → 3 semanas
- Produce otocariosis u otocariasis del carnívoro

SARNA OTODECTICA



DIAGNOSTICO

- Diferencial con *Sarcoptes scabiei* y *Notoedres cati*
- Extracción de secreciones con tórula
- Se busca la presencia de ácaros al examen del pabellón auricular
- **Tratamiento:** Pomadas o ungüentos tópicos
- Ivermectina en perros